

Số: 08./TB-BVTV

Hưng Yên, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA**  
(Từ ngày 10/02/2022 – 16/02/2022)

**I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG**

**1. Thời tiết**

Nhiệt độ: 12 – 18<sup>0</sup>C

Độ ẩm: Trung bình: 80 – 90%

Thời tiết tuần qua trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn liên tục; nhiệt độ dao động từ 12 – 18<sup>0</sup>C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.

**2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng**

- Lúa mới gieo cấy: 12.207ha (trong đó gieo thẳng 5.221 ha).
- Rau màu vụ Xuân: Mới trồng - Phát triển sinh khối: 3.266ha.
- + Ngô Xuân: 3 - 5 lá.
- + Cây họ cà: Phát triển quả - Thu hoạch.
- Cây ăn quả
- + Cây có múi: Ra lộc, ra hoa.
- + Nhân: Phân hóa mầm hoa - Ra hoa.

**II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA**

**1. Trên lúa mới gieo cấy**

- Chuột: Gây hại cục bộ trên lúa mới gieo cấy ở khu vực ven làng, gần gò đồng, kênh mương. Các địa phương đã và đang triển khai tốt chiến dịch diệt chuột diện rộng đợt 1. Đến nay đã có 125/159 xã, phường, thị trấn đặt bả diệt chuột, ước tính toàn tỉnh đã diệt được hơn 4,1 triệu con.

- Ốc bươu vàng: Gây hại cục bộ chủ ở một số chân ruộng gần kênh tưới tiêu; mật độ ốc nơi cao 0,5-2 con/m<sup>2</sup>. Ngoài ra, bệnh nghệt rễ xuất hiện rải rác trên một số ruộng lúa cấy gập rét hoặc bị ngộ độc hữu cơ; cỏ dại phát sinh rải rác trên diện lúa gieo thẳng chưa phòng trừ.

**2. Trên cây rau màu**

- Trên cây họ cà: Bệnh mốc sương tiếp tục gây hại nhẹ, tỷ lệ hại phổ biến 3-5 %, nơi cao 7-10% số lá. Ngoài ra bọ trĩ, bọ phấn, rệp sáp gây hại nhẹ, rải rác.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; mật độ phổ biến 1-3 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 5-7 con/m<sup>2</sup>; bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số vùng chuyên canh rau họ thập tự.

- Trên ngô: Sâu xám, sâu keo gây hại nhẹ, rải rác.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị...): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

**3. Trên cây ăn quả**

- Trên cây có múi: Sâu vẽ bùa, nhện đỏ gây hại nhẹ, rải rác ở những vườn cây đang ra lộc xuân.

- Trên nhãn, vải: Bệnh sương mai xuất hiện và gây hại rải rác trên diện nhãn, vải ra hoa sớm; tỷ lệ hại nơi cao 1-3% chùm hoa. Ngoài ra rầy chổng cánh vân nâu, sâu đục giò hoa gây hại rải rác.

### **III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI**

#### **1. Trên lúa mới gieo cấy**

- Chuột: Tiếp tục gây hại ở khu vực diệt chuột còn sót lại hoặc kém hiệu quả, chủ yếu ở khu vực gần làng, gần khu công nghiệp, gần gò đồng, kênh mương.

- Ốc bươu vàng: Gây hại chủ yếu ở những khu vực ruộng trũng, ruộng gần kênh tưới tiêu.

- Cỏ dại gây hại trên một số chân ruộng vàn cao, khô nước nếu không được phòng trừ tốt nhất là trên diện lúa gieo thẳng.

- Bệnh nghệt rễ tiếp tục xuất hiện và gây hại cục bộ trên một số ruộng lúa chủ yếu ở những ruộng cây gập rết, bị cạn nước hoặc bị ngộ độc hữu cơ.

#### **2. Trên cây rau màu**

- Trên họ cà: Bệnh sương mai, héo xanh, bọ phấn tiếp tục xuất hiện và gây hại rải rác.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số vùng chuyên canh rau họ thập tự.

#### **3. Trên cây ăn quả**

- Trên cây có múi: Sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bọ trĩ, nhện đỏ xuất hiện và gây hại gia tăng ở thời kỳ cây ra lộc non nếu không phòng trừ kịp thời; bọ trĩ xuất hiện và gây hại gia tăng ở thời kỳ cây ra hoa, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm.

- Trên nhãn, vải: Bệnh sương mai, sâu đục giò hoa, sâu đo, rệp muội, bọ trĩ... tiếp tục phát sinh và gây hại trên diện tích nhãn, vải ở thời điểm cây ra hoa - đậu quả, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm, độ ẩm không khí cao và ít nắng. Ngoài ra rầy chổng cánh vân nâu, rệp sáp tiếp phát sinh và gây hại nhẹ.

### **IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯỞNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG**

#### **1. Trên lúa**

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 268/KH-SNN-BVTV ngày 28/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên về Kế hoạch thực hiện Chiến dịch diệt chuột vụ Xuân năm 2022 và Công văn số 105/SNN-TrTr ngày 26/01/2022 về việc tập trung chỉ đạo gieo, cấy lúa vụ Xuân năm 2022.

- Theo dõi chặt chẽ Ốc bươu vàng trên đồng ruộng trước và sau gieo cấy, nơi xuất hiện ốc bươu vàng với mật độ cao phòng trừ bằng mọi biện pháp như bắt thủ công hoặc dùng thuốc trừ ốc như Amani 70WP, Clodansuper 700 WP, Chopper 700 WP...

*Chú ý: Thuốc trừ ốc bươu vàng rất độc với tôm, cua, cá nên không được rút nước xuống ao, hồ sau khi dùng thuốc.*

- Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ trên lúa an toàn, hiệu quả bằng các thuốc có chứa hoạt chất an toàn như: Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm (Sofit 300 EC; Prefit 300 EC), thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm (Acenidax 17WP, sunrice 15WDG, Quinix 32WP) theo liều lượng, thời gian được khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

*Chú ý: Không sử dụng thuốc trừ cỏ trong điều kiện thời tiết rét, nhiệt độ dưới 15<sup>0</sup>C.*

- Những ruộng bị nghệt rễ cần áp dụng biện pháp như phun thuốc kích rễ (khi thời tiết ẩm), bón bột cho những ruộng lúa bị ngộ độc hữu cơ... để cây lúa nhanh phục hồi và phát triển tốt.

## 2. Trên cây rau màu

- Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy xuất hiện mật độ cao trên rau họ thập tự, sâu đục quả, rệp, bọ trĩ hại đậu đỗ, dưa chuột cần phòng trừ bằng thuốc sinh học như: Aizabin WP, Vi – BT, Bitadin WP, VK.

- Trên ngô vụ Xuân: Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu; chú trọng việc sử dụng bẫy bả chua ngọt để diệt trưởng thành (bướm). Nơi xuất hiện mật độ sâu cao (trên 20% cây bị triệu chứng sâu hại) cần phòng trừ bằng các thuốc đặc trị như Dylan 2EC, Comda Gold 5WG, Radiant 60SC, Match 050EC..., khi sâu đa số tuổi 1-3.

## 3. Trên cây ăn quả

Yêu cầu Trạm BVTV các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và sự phát sinh của các đối tượng sâu, bệnh hại nhãn, vải và cây có múi để kịp thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để thúc đẩy quá trình ra hoa, đậu quả; kịp thời khắc phục khi gặp thời tiết bất thuận như mưa axit (mưa có tạp chất ở đầu vụ Xuân) và chủ động phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại đạt hiệu quả cao.

- Cây nhãn, vải: Bệnh sương mai, thán thư phát sinh, phát triển trong điều kiện thời tiết ẩm, độ ẩm không khí cao và ít nắng cần phòng trừ sớm bằng thuốc đặc hiệu như Ridomil Gold 68 WG, Dosay 45WP, Phytocide 50WP; phòng trừ rệp sáp, rệp muội, bọ phấn nơi có mật độ cao bằng các thuốc Movento 150OD, Radiant 60SC, Kola 700 WP; phòng trừ sâu đo, bọ xít bằng thuốc Dylan 2EC, Trebon 10EC.

- Trên cây có múi: Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật độ cao (chủ yếu ở thời kỳ cây ra lộc non, cây ra hoa – đậu quả non) bằng các thuốc đặc hiệu như: Radiant 60SC, Kola 700 WG...; nhện đỏ phòng trừ bằng các thuốc đặc hiệu như Comite 73EC, Detect 50WP, Catex 3.6E, theo nguyên tắc “4 đúng”.

*Lưu ý:*

+ *Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc “4 đúng” tuân thủ thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.*

+ *Phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên nhãn vải tập trung vào thời điểm phát triển giò hoa đến trước khi hoa nở để đảm bảo an toàn cho các đàn ong và chất lượng mật ong.*

+ *Các địa phương có Mã số vùng trồng cây ăn quả cần hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ chặt chẽ quy định về điều kiện duy trì mã số vùng trồng và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn./.*

### Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- TT BVTV phía Bắc;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài, Báo Hưng Yên;
- Trạm BVTV các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, Phòng KT.

Đề  
báo  
cáo

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Lê Minh Nam**

