

SỞ NN VÀ PTNT HUNG YÊN	
Số: 48	/TB-BVTV
ĐẾN	Số: 4658
	Ngày: 17/11/2017
	Chuyên:

Hung Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(Từ ngày 09 - 15/11/2017)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ: 21 - 30⁰C.
Độ ẩm: Trung bình: 70 - 80 %
Số giờ nắng (Tổng số): 16 giờ.

Thời tiết tuần qua trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ dao động từ 21 - 30⁰C. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Trồng rau màu vụ Đông: 10.624 ha. Trong đó: Ngô 3.374 ha; Bí các loại: 1.441 ha; Lạc, đậu tương: 349 ha; khoai tây: 168 ha; Rau màu các loại: 4.422 ha.
- Cây ăn quả:

Cây có múi: GDST: Phát triển quả - quả chín, thu hoạch.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA

1. Trên cây rau màu vụ Đông:

- Trên ngô: Sâu khoang, sâu hại nõn tiếp tục gây hại nhẹ, rải rác.
- Trên bầu, bí, dưa chuột: Bệnh sương mai, thán thư, phấn trắng tiếp tục gây hại nhẹ và có xu hướng gia tăng, tỷ lệ hại phổ biến 2 - 3%, nơi cao 7 % số lá. Ngoài ra Bọ phấn, rệp, bọ trĩ, sâu xanh gây hại rải rác.
- Sâu xanh, bọ nhảy, sâu tơ gây hại cục bộ trên rau họ thập tự. Ngoài ra, sâu khoang gây hại nhẹ rải rác trên một số cây rau màu mới trồng; rệp muội, bọ trĩ gây hại nhẹ trên đậu đỗ.

2. Trên cây ăn quả:

- Trên cây có múi: Bệnh khô cuống quả tiếp tục gây hại nhẹ tại một số vườn phòng trừ kém, tỷ lệ hại phổ biến 1-3 %, nơi cao 5-7% số lá, quả. Nông dân đã phòng trừ đạt kết quả tốt.
+ Ruồi vàng tiếp tục gây hại rải rác trên các loại cây ăn quả như Ôi, cam, bưởi... ở thời kỳ quả chín.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên rau màu vụ Đông:

- Trên Ngô đông: Sâu khoang, sâu hại nõn tiếp tục gây hại nhẹ và rải rác; Bệnh lùn sọc đen có khả năng xuất hiện triệu chứng rải rác.
- Trên bí, dưa chuột : Bệnh sương mai, thán thư, phấn trắng sẽ tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng, bọ trĩ, rệp muội tiếp tục gây hại cục bộ.
- Sâu xanh, bọ nhảy, sâu tơ tiếp tục gây hại cục bộ trên rau họ thập tự. Ngoài ra, sâu khoang gây hại nhẹ rải rác trên một số cây rau màu mới trồng; rệp muội, bọ trĩ gây hại nhẹ trên đậu đỗ.

2. Trên cây ăn quả: