

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(Từ ngày 03/02/2022 – 09/02/2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ: $13 - 18^{\circ}\text{C}$

Độ ẩm: Trung bình: $80 - 90\%$

Thời tiết tuần qua trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn liên tục; nhiệt độ dao động từ $13 - 18^{\circ}\text{C}$. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

- Mạ vụ Xuân: 1.144ha; lúa mới cấy: 2.067ha (Gieo thẳng 1.525ha, cấy 542ha).
- Rau màu vụ Xuân: Mới trồng - Phát triển sinh khối: 2.165ha.
 - + Ngô Xuân: 3 - 4 lá.
 - + Cà chua: Phát triển quả - Thu hoạch.
 - Cây ăn quả
 - + Cây có múi: Ra hoa - quả non.
 - + Nhãn: Phân hóa mầm hoa - Ra hoa.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA

1. Trên lúa mới gieo cấy

- Chuột hại nhẹ, cục bộ trên lúa mới gieo cấy ở khu vực ven làng, gần gò đồng, kênh mương. Các địa phương đã và đang triển khai tốt chiến dịch diệt chuột diện rộng đợt 1. Đến nay đã có 100/159 xã, phường, thị trấn đặt bả diệt chuột, ước tính toàn tỉnh đã diệt được hơn 3 triệu con.

- Ốc bươu vàng xuất hiện và gây hại cục bộ chủ ở một số chân ruộng gần kênh tưới tiêu; mật độ ốc nai cao $0,5-2$ con/ m^2 .

2. Trên cây rau màu

- Trên cây họ cà: Bệnh mốc sương tiếp tục gây hại nhẹ, tỷ lệ hại phổ biến 3-5 %, nơi cao 7-10% số lá. Ngoài ra bọ trĩ, bọ phấn gây hại nhẹ, rải rác

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; mật độ phổ biến 1-3 con/ m^2 , cục bộ 5-7 con/ m^2 ; bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số vùng chuyên canh rau họ thập tự.

- Trên ngô: Sâu xám, sâu keo gây hại nhẹ, rải rác.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị...): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

3. Trên cây ăn quả

- Trên cam, quýt: Sâu vẽ bùa, nhện đỏ gây hại nhẹ, rải rác ở những vườn cây đang ra lộc xuân.

- Trên nhãn: Bệnh sương mai xuất hiện và gây hại rải rác trên diện nhãn ra hoa sớm; tỷ lệ hại nơi cao 1-3% chùm hoa.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên lúa mới gieo cấy

- Chuột tiếp tục gây hại nhẹ, cục bộ ở khu vực diệt chuột còn sót lại hoặc kém hiệu quả, chủ yếu ở khu vực gần làng, gần khu công nghiệp, gần gò đồng, kênh mương.

- Óc bươu vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại chủ yếu ở những khu vực ruộng trũng, ruộng gần kênh tưới tiêu.

- Cỏ dại gây hại trên một số chân ruộng vàn cao, khô nước nếu không được phòng trừ tốt nhất là trên diện lúa gieo thăng.

- Bệnh nghẹt rễ sẽ xuất hiện và gây hại cục bộ trên một số ruộng lúa chủ yếu ở những ruộng cấy gấp rét, bị cạn nước hoặc bị ngộ độc hữu cơ.

2. Trên rau màu vụ Xuân

- Trên họ cà: Bệnh sương mai, héo xanh tiếp tục xuất hiện và gây hại rải rác.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số vùng chuyên canh rau họ thập tự.

3. Trên cây ăn quả

- Trên cây có múi: Sâu vẽ bùa, nhện đỏ xuất hiện và gây hại ở thời kỳ cây ra lộc non nếu không phòng trừ kịp thời; bọ trĩ xuất hiện và gây hại gia tăng ở thời kỳ cây ra hoa, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm.

- Trên nhãn, vải:

+ Bệnh sương mai, chồi rồng tiếp tục phát sinh và gây hại trên diện tích nhãn, vải trong điều kiện thời tiết ẩm, độ ẩm không khí cao và ít nắng.

+ Sâu đục giò hoa, rầy chổng cánh vân nâu, rệp sáp tiếp tục phát sinh và gây hại nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯỞNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên lúa

Thực hiện tốt Kế hoạch số 268/KH-SNN-BVTM ngày 28/12/2021 và công văn số 105/SNN-TrTr ngày 26/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên về Kế hoạch thực hiện Chiến dịch diệt chuột vụ Xuân năm 2022 và về việc tập trung chỉ đạo gieo, cấy lúa vụ Xuân năm 2022.

- Theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của Óc bươu vàng trên đồng ruộng trước và sau gieo cấy, nơi xuất hiện óc bươu vàng với mật độ cao phòng trừ bằng mọi biện pháp như bắt thủ công hoặc dùng thuốc trừ ốc như Amani 70WP, Clodansuper 700 WP, Chopper 700 WP...

Chú ý: Thuốc trừ óc bươu vàng rất độc với tôm, cua, cá nên không được rút nước xuống ao, hồ sau khi dùng thuốc.

- Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ trên lúa an toàn, hiệu quả bằng các thuốc có chứa hoạt chất an toàn như: Thuốc trừ cỏ tiền mầm (Sofit 300 EC; Prefit 300 EC), thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm (Acenidax 17WP, sunrice 15WDG, Quinix 32WP) theo liều lượng, thời gian được khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

Chú ý: Không sử dụng thuốc trừ cỏ trong điều kiện thời tiết rét, nhiệt độ dưới 15°C.

- Những ruộng bị nghẹt rễ cần áp dụng biện pháp như làm cỏ sục bùn, phun thuốc kích rễ (khi thời tiết ấm), bón vôi bột cho những ruộng lúa bị ngộ độc hữu cơ... để cây lúa nhanh phục hồi và phát triển tốt.

2. Trên cây rau màu vụ Xuân

- Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy xuất hiện mật độ cao trên rau họ thập tự, sâu đục quả, rệp, bọ trĩ hại đậu đỗ, dưa chuột cần phòng trừ bằng thuốc sinh học như: Aizabin WP, Vi – BT, Bitadin WP, VK.

- Trên ngô vụ Xuân: Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu; chú trọng việc sử dụng bẫy bả chua ngọt để diệt trưởng thành (bướm). Nơi xuất hiện mật độ sâu cao (trên 20% cây bị triệu chứng sâu hại) cần phòng trừ bằng các thuốc đặc trị như Dylan 2EC, Comda Gold 5WG, Radiant 60SC, Match 050EC..., khi sâu đa số tuổi 1-3.

3. Trên cây ăn quả

Yêu cầu Trạm BVTM các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và sự phát sinh của các đối tượng sâu, bệnh hại nhăn, vải và cây có múi để kịp thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để thúc đẩy quá trình ra hoa, đậu quả; kịp thời khắc phục khi gặp thời tiết bất thuận như mưa axit (mưa có tạp chất ở đầu vụ Xuân) và chủ động phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại đạt hiệu quả cao.

- Cây nhăn, vải: Bệnh sương mai, thán thư phát sinh, phát triển trong điều kiện thời tiết ẩm, độ ẩm không khí cao và ít nắng cần phòng trừ sớm bằng thuốc đặc hiệu như Ridomil Gold 68 WG, Dosay 45WP, Phytocide 50WP; phòng trừ rệp sáp, rệp muội, bọ phấn noci có mật độ cao bằng các thuốc Movento 150OD, Radiant 60SC, Kola 700 WP; phòng trừ sâu đeo, bọ xít bằng thuốc Dylan 2EC, Trebon 10EC.

- Trên cây có múi: Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật độ cao (chủ yếu ở thời kỳ cây ra lộc non, cây ra hoa – đậu quả non) bằng các thuốc đặc hiệu như: Radiant 60SC, Kola 700 WG...; nhện đỏ phòng trừ bằng các thuốc đặc hiệu như Dylan 2EC, Detect 50WP, Catex 3.6E, theo nguyên tắc “4 đúng”.

Lưu ý:

+ Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc “4 đúng” tuân thủ thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên nhăn vải tập trung vào thời điểm phát triển giờ hoa đến trước khi hoa nở để đảm bảo an toàn cho các đàn ong và chất lượng mật ong.

+ Các địa phương có Mã số vùng trồng cây ăn quả cần hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ chặt chẽ quy định về điều kiện duy trì mã số vùng trồng và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn./*dk*

Nơi nhận:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| - Văn phòng Tỉnh Uỷ, UBND Tỉnh; | Để |
| - Cục Bảo vệ thực vật; | báo |
| - Sở Nông Nghiệp và PTNT; | cáo |
| - TT BVTM phía Bắc; | |
| - UBND các huyện, thành phố; | |
| - Đài, Báo Hưng Yên; | |
| - Trạm BVTM các huyện, tx, tp; | |
| - Lưu: VT, Phòng KT. | |

KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Minh Nam

