SAO Y; Chi cục Bảo vệ thực vật; 09/11/2022 14:15:05

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH HƯNG YÊN
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /TB-BVTV

Hưng Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(Từ ngày 03/11/2022 - 09/11/2022)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ: 18 - 30^{0}C.

Độ ẩm: Trung bình: 55 – 75%.

Thời tiết tuần qua ngày nắng hanh, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 18 - 30^{0}C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho trồng cây vụ Đông và cây trồng phát triển.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

- Rau màu vụ Đông: đến nay toàn tỉnh gieo trồng được 5.528 ha.

+ Giai đoạn sinh trưởng: Mới trồng - phát triển sinh khối - thu hoạch.

- Cây ăn quả:

+ Cây có múi: Chín sinh lý - chín, thu hoạch.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA

1. Trên rau màu

- Trên bí, dưa chuột: Bệnh thán thư, sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh và gây hại nhẹ trên diện đang ở giai đoạn ra quả - cuối thu hoạch; tỷ lệ hại phổ biến 2-3% số lá, nơi cao trên 5-7% số lá (cấp bệnh 1-3).

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; mật độ phổ biến 1-2 con/m^2, cục bộ 5-7 con/m^2. Bệnh lở cổ rễ xuất hiện cục bộ trên những ruộng trũng thoát nước kém. Ngoài ra, rệp muội, bọ nhảy gây hại cục bộ những ruộng chuyên trồng rau.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

- Trên Ngô: Sâu keo mùa thu xuất hiện gây hại cục bộ, mật độ nơi cao 0,5 – 1,5 con/m^2, cá biệt có nơi 5 con/m^2. Nông dân đang tiếp tục phòng trừ những nơi có mật độ sâu cao đạt kết quả tốt.

2. Trên cây ăn quả

- Trên cây có múi: Bệnh khô cuống quả, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh Greenning xuất hiện rải rác.

- Ruồi đục quả gây hại nhẹ trên một số cây ăn quả bước vào giai đoạn quả chín sinh lý (bưởi, ổi…), nhất là ở các vườn trồng dầy, ít áp dụng các biện pháp phòng trừ.

Nhìn chung, nông dân đã và đang áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại đạt kết quả tốt.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên rau màu

- Trên bí, dưa chuột: Bệnh thán thư, sương mai, phấn trắng tiếp tục gây hại gia tăng; bệnh héo xanh, lở cổ rễ tiếp tục gây hại cục bộ ở một số ruộng trũng; rệp muội, bọ trĩ, ruồi vàng gây hại nhẹ, rải rác.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; rệp, bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số ruộng trồng chuyên canh rau.

- Trên Khoai tây: Bệnh héo xanh xuất hiện và gây hại rải rác trên một số giống khoai tây Hà Lan.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

- Trên Ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại cục bộ, chủ yếu ở những khu vực trồng trồng xen kẹp với cây trồng khác.

2. Trên cây ăn quả

- Trên cây có múi: Bệnh khô cuống quả, bệnh vàng lá - thối rễ, bệnh Greenning tiếp tục gây hại rải rác.

- Ruồi đục quả tiếp tục gây hại gia tăng trên một số cây ăn quả (ổi, cây có múi,… giai đoạn quả chín) trong thời gian tới, nhất là ở các vườn trồng dầy, ít áp dụng các biện pháp phòng trừ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây rau màu

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp tục chủ động trồng cây vụ Đông theo đúng lịch thời vụ với từng loại cây trồng, đồng thời chăm sóc kịp thời diện đã gieo trồng để đảm bảo năng suất và chất lượng.

- Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh trên rau màu chưa đến thời gian thu hoạch, đồng thời khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ ủ mục với vôi bột hoặc các chế phẩm sinh học như Vita Nấm, Trichoderma,… để phun hoặc tưới cho cây nhằm cung cấp dinh dưỡng để cây trồng phát triển tốt, đồng thời góp phần cải tạo đất và làm giảm nguồn dịch hại cây trồng tồn tại trong đất sẽ giảm được đáng kể số lần phun thuốc BVTV.

+ Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy xuất hiện mật độ cao trên rau họ thập tự, sâu đục quả, rệp, bọ trĩ hại đậu đỗ, dưa chuột cần phòng trừ bằng thuốc sinh học như: Aizabin WP, Vi - BT, Bitadin WP, VK.

+ Bệnh sương mai, mốc sương, phấn trắng xuất hiện và có xu hướng gây hại trên cà chua, dưa chuột, bí các loại, đậu đỗ … cần phun chế phẩm Nano bạc, Nano đồng để phòng bệnh nhằm đảm bảo an toàn VSTP.

- Đối với nhóm rau khác (nhóm rau gia vị): Các đối tượng sâu, bệnh gây hại nhẹ nên không phải áp dụng biện pháp phòng trừ.

- Trên ngô vụ Đông: Cần áp dụng tổng hợp biện pháp để phòng trừ Sâu keo mùa thu, bao gồm các biện pháp như: Sử dụng bả chua ngọt để diệt trưởng thành (bướm) trước khi đẻ trứng; Thường xuyên thu gom và tiêu hủy các ổ trứng trên đồng ruộng. Nơi xuất hiện sâu có mật độ cao cần phòng trừ bằng các thuốc như Dylan 2EC, Comda Gold 5WG, Radiant 60SC, Match 050EC, khi sâu non đa số tuổi 1,2,3; phun bằng bình phun 1 pec và phun trực tiếp vào nõn ngô.

2. Trên cây ăn quả

- Trên cây có múi:

+ Đối với bệnh vàng lá thối rễ: Cần thường xuyên áp dụng tổng hợp các biện pháp để phòng trừ như: Bón vôi bột bổ sung cho những vườn trồng đất chua và diệt tuyến trùng hại rễ; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học như Tricoderma, Vita Nấm hoặc phân hữu cơ ủ mục với chế phẩm sinh học… để cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cải tạo đất và giảm nguồn nấm bệnh trong đất; khi bệnh chớm xuất hiện cần phòng trừ bằng thuốc trừ nấm đặc hiệu có phổ tác động rộng như Ridomil Gold 68WG, Amistar top 525SC (kết hợp phun trên lá và tưới gốc); nhổ bỏ những cây bị bệnh Greenning và chuẩn bị trồng bổ sung cây cho vụ tới để đảm bảo mật độ.

- Đối với Ruồi đục quả gây hại các loại cây ăn quả:

Thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng trừ Ruồi đục quả trên các vườn cam, quýt, bưởi và nhóm cây ăn quả khác (nhất là ở thời kỳ quả bước vào giai đoạn chín sinh lý đến khi thu hoạch) bằng các biện pháp như: Bao quả, sử dụng bẫy Feromol, bẫy xua đuổi hoặc phun một số chế phẩm chiết xuất từ thảo mộc có tính xua đuổi ruồi vàng như Support Ruồi vàng, Chivi.

Vệ sinh đồng ruộng, thu gom những quả bị rụng, bộ phận cây mang tàn dư sâu, bệnh để tiêu hủy nhằm giảm nguồn sâu, bệnh phát tán lây lan trên đồng ruộng.

Lưu ý: Tuyệt đối không lạm dụng thuốc BVTV trên các loại cây trồng, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết và phải tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng"; đảm bảo thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh Uỷ, UBND Tỉnh; (thay báo cáo)
- Cục Bảo vệ thực vật; (thay báo cáo)
- Sở Nông Nghiệp và PTNT; (thay báo cáo)
- TTBVTV phía Bắc; (thay báo cáo)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và TH tỉnh, Báo Hưng Yên;
- Trạm BVTV các huyện, thị xã, tp;
- Lưu: VT, Phòng KT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Lê Minh Nam